

Op zoek naar de Grote weerschijnvlinder

VWD in Zwiggelte 15-4-2024, Joop Verburg

Sylvio Lindhout
Ecogroen



Foto Elize Stellingsma



Foto Titia Wolterbeek



Ei-afzet

De eitjes worden hoog in de bomen op beschaduwde bladeren afgezet. Dat moet niet alleen een warm plekje zijn, ook moet de luchtvochtigheid er hoog zijn. Daarom staan geschikte bomen op zonnige, beschutte plaatsen.

Zij zetten de eitjes afzonderlijk af op de bovenkant van oude blaadjes in vier tot vijf meter hoge wilgen. Dit is vooral het geval bij kleine inhammen langs brede bospaden en bij luw gelegen bosranden.



Foto Lepiforum.de



Foto Lepiforum.de

Levenscyclus

Rups: eind juli-eind juni. Jonge rupsen eten op een karakteristieke manier van het blad van de waardplant aan beide zijden van de nerf.



Foto
Vlinderstichting

sinder



NIET

Grote weerschijnvlinder



snuitvlinder

Snuitvlinder



roesje

Roesje



Euura sp. (bladwesp)

Bladwesp



???

????



divers

divers

Jack
Wollskin

under
determines



De soort overwintert als halfvolgroeide rups.



De verpopping vindt hoog in de boom plaats.



Foto Lepiforum.de

vlinders

Eind juni verschijnen de eerste vlinders die zich vooral voeden met honingdauw en sap van bloedende bomen. Ze worden geregeld lastiggevallen door wespen en andere insecten die ook op deze zoetheid afkomen



Foto Astrid Willemsen

Vliegtijd en gedrag

Begin juni-begin augustus in één generatie. De vlinders voeden zich eerst vooral met honingdauw en sap van bloedende bomen en leven hoog in de bomen. De mannetjes komen soms naar de grond om te drinken van plassen, kadavers en soms zelf bezwete mensen. Er worden zelden meerdere vlinders bij elkaar gezien.













Foto Eef Arnolds



EINDE